

GLOBAL HEALTH CONSORTIUM GHC
9th INTERNATIONAL GLOBAL HEALTH CONFERENCE
ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

ROUND TABLE : *Main barriers for implementing ASPs and how to overcome them*

Dr. Luis Cuéllar Ponce de León
Enfermedades Infecciosas y Tropicales-UPCH
Epidemiología Clínica-UPCH
Servicio de Infectología – INEN
Profesor de Medicina – UNFV
Past Presidente de la SPEIT

Miami - Florida
2019



INSTITUTO
NACIONAL DE
ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS



Comité de control y
prevención de
infecciones
intrahospitalarias



*Servicio de
Infectología INEN*

*CONFLICTO
DE INTERÉS*

NINGUNO


AGENDA

- 1. Experiencia.***
- 2. Dificultades.***
- 3. Lección aprendida para llevar a casa.***

Encuesta de prevalencia puntual
sobre uso de ATB. OPS / OMS. INEN
2017



ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS. OPS/OMS. INEN 2017.



AICU= Unidad de Cuidados Intensivos.

AHRW= Sala de adultos de alto Riesgo.


PHRW= Sala de pediatría de alto Riesgo.

N= 241 pacientes



ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS. OPS/OMS. INEN 2017.

TIPO DE ESPECIALIDADES



ICUMIX= Unidad de Cuidados Intensivos mixta.
MEDONCO= Oncología médica.
SURONCO= Cirugía oncológica.
MEDBMT= Trasplante de medula ósea.


N= 241 pacientes



ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS.

OPS/OMS. INEN 2017.

TIPO DE INDICACIÓN




N= 241 pacientes



ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS. OPS/OMS. INEN 2017.


ANTIMICROBIANOS MÁS USADOS





ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS. OPS/OMS. INEN 2017.


DIAGNÓSTICOS PREVALENTES



N= 241 pacientes


ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS. OPS/OMS. INEN 2017

ADECUACIÓN A LAS NORMAS : TRATAMIENTO



ENCUESTA DE PREVALENCIA PUNTUAL SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS. OPS/OMS. INEN 2017

ADECUACIÓN A LAS NORMAS : PROFILAXIS



***EFFECTOS CURIOSOS
DE LOS
ANTIMICROBIANOS***

Antipiréticos

Antiinflamatorios

Analgésicos

Antineoplásicos

Ansiolíticos

BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE UN PCIAAS/PROA

- 1. Falta de decisión a nivel de las autoridades nacionales.**
- 2. Falta de compromiso a nivel de la alta dirección de la institución.**
- 3. Necesidad de cambio cultural :**
 - Compromiso a nivel del personal médico de la institución .**
 - Compromiso a nivel del resto del personal asistencial de la institución.**
- 4. Costos:**
 - Recursos humanos**
 - Recursos materiales**
 - Intervenciones**

- ***A mayor “distancia de poder”, menor empoderamiento.***
- ***Países con elevado aversión a la incertidumbre presentan un mayor nivel consumo de antimicrobianos.***
- ***Solo la implementación de estrategias específicas que puedan contrarrestar estos patrones culturales, en conjunto con otras medidas, permitirán elevar el nivel de seguridad en la atención de nuestros pacientes.***

Tanto las medidas de prevención de control de infecciones como la prescripción y el consumo de antimicrobianos son actos que suelen estar influenciados por el comportamiento humano.

MUCHAS GRACIAS



lcuellar@inen.sld.pe

fcuepaz@infonegocio.net.pe